

# Осень - время делать прививку от гриппа

---

В наступающем эпидемиологическом сезоне работа по профилактике гриппа должна осуществляться в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (далее - СП 3.1.2.3117-13) (приложение 1), которые вступили в силу 29.04.2014. В новых правилах указывается, что «грипп представляет большую опасность из-за развития серьезных осложнений, особенно у детей до 5 лет» и некоторых категорий взрослых, и «именно поэтому специфической профилактике гриппа перед сезоном повышенной заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) уделяется большое внимание».

Оптимальное время введения противогриппозной вакцины - сентябрь - ноябрь, до начала возможного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Прививку не запрещается делать и в более поздние сроки. Иммунитет после введения вакцины формируется через 14 дней и сохраняется в течение года. Профилактическая эффективность вакцинации составляет 70-90%.

## **О проведении вакцинации**

Дети, посещающие дошкольные учреждения, подлежат ежегодной вакцинации против гриппа. Прививают их с согласия родителей или законных представителей.

Как указывается в СП 3.1.2.3117-13, *инактивированная* вакцина против гриппа может вводиться одновременно с другими *инактивированными* вакцинами, применяемыми в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

В соответствии с новыми санитарными правилами при проведении профилактических прививок против гриппа прививочными бригадами в организациях для детей и взрослых руководитель учреждения должен оказывать содействие медицинским работникам в проведении иммунизации.

В СП 3.1.2.3117-13 регламентируется возможность проведения предсезонной вакцинации на дому. В пункте 11.11 ст. IX говорится: «При проведении массовой предсезонной вакцинации против гриппа допускается проведение профилактических прививок на дому прививочными бригадами в установленном нормативными документами порядке».

**С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%.**